

Julietta®

Source naturelle
de protection

Biofongicide tomate anti-botrytis à base de levure.

Utilisation facile, souple d'emploi pour les traitements précoces et tardifs. Julietta® permet de conserver votre potentiel et la qualité de vos récoltes.



BIOFONGICIDE ANTI BOTRYTIS TOMATE, AUBERGINE, POIVRON, CHILIS, PIMENT
AMM N°2190010

IDENTITÉ PRODUIT



Matière active:
96,1% *S.cerevisiae*
souche LAS02
(10¹³ cfu/kg)



Formulation :
granulé
dispersable (WG),
facile à mélanger



Homologué
sur **tomate,**
aubergine, poivron,
chilis, piment



**Classification
du produit :** sans
classement



Exempté de Limite
Maximale de Résidus



Délai de réentrée **8H**
pour les applications
en milieu fermé



**Délai avant
récolte :** 1 jour



Homologué
pour les cultures
sous-abri



**Nombre maximal
d'applications :** 8



Conditionnement :
sac aluminisé sous vide
0,5 Kg et 5 Kg

AVANTAGES PRODUIT

- ✓ **Simple d'emploi :**
mise en solution facile dans le pulvérisateur
- ✓ **Pas d'impact de la qualité de l'eau**
(pH, dureté,...)
- ✓ **Pas de marquage des fruits**
- ✓ Compatible **0 résidu***
et **Agriculture Biologique**
- ✓ **Couverture possible de toute
la période de risque** (8 applications)
- ✓ Application possible au plus prêt de la récolte
(délai avant récolte 1 jour) **pour garantir la qualité
et la conservation des fruits**

MODE D'ACTION

- Agit par compétition **spatiale**
et **nutritive** face à la pourriture
grise (*Botrytis cinerea*)
- Action strictement **préventive**
- S'installe rapidement dans les
zones fragilisées qui sont des
portes d'entrée au botrytis sur
les fruits, tiges et feuilles :**
micro-blessures, plaies de taille...

MODE D'APPLICATION

**Julietta® agit de façon
préventive avant l'apparition
du botrytis.**

L'application se fera avec une
bonne qualité de pulvérisation
en visant particulièrement et
avec une bonne couverture les
zones à protéger : fruits, feuilles,
plaies de taille ou de récolte.

**Observation
de plaies de taille
protégées
par Julietta®**


Source :
Agrauxine by Lesaffre
Plant Care, 2018

*Les substances actives
exemptées de Limites Maximale
de Résidus sont en général
acceptées dans les cahiers de charge
type « zéro résidu » / « sans résidu ».
Renseignez-vous auprès de votre
organisme certificateur.

 **Agrauxine**
by Lesaffre

RÉSULTATS D'ESSAIS

Julietta® obtient des résultats techniques comparables aux fongicides de référence conventionnelles et de biocontrôle.



% Fréquence de Botrytis sur feuilles Comparaison face aux références Biocontrôle

4 essais sous serre BPE




TNT



référence biocontrôle à dose homologuée de 6 à 8 applications



Julietta® 6 à 8 applications 2,5 Kg/Ha



% Fréquence de Botrytis sur feuilles comparaison face à la référence fongicide conventionnelle

6 essais sous serre BPE



TNT




Référence Conventionnelle à dose homologuée 4 à 5 applications



Julietta® 4 à 5 applications 2,5 Kg/Ha

PROGRAMME D'APPLICATION

Positionner **Julietta®** juste après une phase d'effeuillage pour prévenir des phases de contamination



Avantages des programmes avec Julietta®:

- Une protection naturelle, exemptée de Limite Maximale de Résidus = pas de résidu* dans la récolte
- Pas de marquage des fruits
- Delai de réentrée faible
- Jusqu'à 8 applications possibles pour couvrir toutes les phases de risques pendant la saison

Préconisations

- Applications préventives sur l'ensemble des organes à protéger
- Positionnement : préventif 1 fois par mois et tous les 10 à 14j pendant les phases de risques accrues
- Jusqu'à 8 applications possibles
- Utilisation en solo ou en programme
- Veiller à une bonne qualité d'application sur l'ensemble des organes ciblés
- Afin de garantir une bonne efficacité, mélanger Julietta® 15 minutes minimum avant l'application et agiter avant l'application soit manuellement soit via le système d'agitation du pulvérisateur
- Ne pas utiliser Julietta® en mélange avec d'autres préparations fongicides. Respecter un délai de 3 jours avant et après application de Julietta® pour les préparations fongicides à base de cuivre. Respecter un délai de 7 jours avant et après application de Julietta® pour les préparations fongicides à base de soufre et les préparations fongicides à mode d'action asséchant.